

KRZTUSIEC CECHUJE SIĘ WYSOKĄ ZAKAŹNOŚCIĄ!



Zakażenie następuje drogą kropelkową.



Ok. 80% osób nieuodpornionych zakaży się po kontakcie z osobą zakażoną, w środowisku domowym.



Starsze dzieci, młodzież i osoby dorosłe przy skąpych lub nietypowych objawach choroby stanowią istotne źródło zakażenia dla niemowląt, dla których choroba jest najbardziej niebezpieczna.



Ani przechorowanie krztuśca, ani szczepienie nie dają odporności na całe życie, dlatego po podstawowych szczepieniach w dzieciństwie konieczne są dawki przypominające u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

SZCZEPIENIA PRZECIW KRZTUŚCOWI POTRZEBNE SĄ W KAŻDYM WIEKU



DTP/DTaP dla dzieci	Tdap dla nastolatków	Tdap dla kobiet w ciąży	Tdap dla dorosłych
2, 3-4, 5-6 miesiąc* 16-18 miesiąc* 6 lat*	14 lat* 19 lat**	27-36 tydz. ciąży**	1 dawka co 10 lat**

* szczepienie obowiązkowe (bezpłatne); **szczepienie zalecane (odpłatne)