

WYKAZ GRUP WIEKOWYCH OBJĘTYCH PROFILAKTYKĄ WRAZ ZE SPOSOBEM PODAWANIA I INFORMACJĄ O PREPARATACH JODOWYCH

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia preparat jodowy otrzymują
wszystkie osoby do 60 roku życia.

GRUPA WIEKOWA	IŁOŚĆ TABLETEK (DAWKA JEDNORAZOWA)	SPOSÓB PODANIA	UWAGI
Noworodki i niemowlęta do 1-go miesiąca życia	$\frac{1}{4}$ tabletki (12,5 mg jodu)	Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi niemowlakowi lub dziecku.	Całkowite rozpuszczenie tabletki może trwać do 6 minut.
Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia	$\frac{1}{2}$ tabletki (25 mg jodu)	Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku. Tabletkę można rozgnieść lub rozpuścić w wodzie, syropie lub innym płynie.	Całkowite rozpuszczenie tabletki może trwać do 6 minut.
Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat	1 tabletką (50 mg jodu)	Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletkę można pokruszyć i dodać do chłodnego napoju.	x
Dzieci powyżej 12 roku życia oraz dorośli (do 60 roku życia)	2 tabletki (100 mg jodu)	Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.	x
Kobiety ciężarne (każdy wiek)	2 tabletki (100 mg jodu)	Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.	x
Kobiety karmiące piersią (każdy wiek)	2 tabletki (100 mg jodu)	Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.	Stanowcze zalecenie! powstrzymania się przez 48 godz. od karmienia piersią oraz przejście na żywienie dziecka preparatami mleka w proszku.

UWAGA: Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (dla tabletek jodku potasu o mocy 65 mg)

1 tabletką zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu.